

**Protegé todo el potencial
de tu cultivo de trigo
con la mayor tecnología.**



**Sumitomo Chemical con su amplio portfolio te aseguran
un cultivo protegido contra malezas, enfermedades
y plagas en cada etapa de su desarrollo.**

TRIGO



Z0
Germinación

Z1-Z2
Establecimiento
Macollaje

Z3
Encañazón

Z4-Z8
Floración
Llenado de granos

Z9
Madurez

Portfolio

Barbecho Químico

Pre Siembra

Nutar[®] 35 FS
Matrero[®] 60 FS

Curasemillas

Weedar[®] Full
CreditFull
CreditP

Weedar[®] Full
MCPA[®] 28
Mextrol[®]
 **Gizmo[®]**
 **Azbany[®]**
 **AzbanyMaxx**
Kamba[®]
KambaFull

Herbicidas

 **Havoc**
 **HavocMaxx**
 **EmblemMaxx**
Paraquat[®] 27,6
Sumyzin
Toram[®]

Fungicidas

EXCALIA[®] MAX^{*}
 **TazerXpert**
Tebuconazole[®] 43
Mancozeb[®] 75 WG

Insecticidas

 **Klorpan**

HERBICIDAS

Azbany

- | **Herbicida a base de fluroxypir 28,8% (20% Equivalente ácido).**
- | Formulado como concentrado emulsionable (EC).
- | Acción hormonal para el control de malezas de hoja ancha postemergente y sistémico.
- | Selectivo en Trigo, Avena, Cebada, Centeno, Cebolla y Caña de Azúcar.
- | Alta compatibilidad en mezclas 2,4-D (Weedar Full), MCPA y graminicidas selectivos.
- | Excelente control de trebol blanco, lotus sp., soja guacha y malva blanca.

Modo de Acción: Auxinas sintéticas. Acción similar al ácido indolacético (IAA). Grupo D.
Dosis Recomendada: 350-600 cc/ha*
Observaciones: En barbecho o sobre trigo en mezcla con WeedarFull® 0,3-0,5 lt/ha/ MCPA 1-1,5 lt/ha.
Presentación: 4 x 5 Lts.

AzbanyMaxx

- | **Herbicida base de fluroxypir 48% (33,3% Equivalente ácido).**
- | Formulado como concentrado emulsionable (EC).
- | Acción hormonal para el control de males de hoja ancha postemergente y selectivo.
- | Selectivo en Trigo, Avena, Cebada, Centeno, Cebolla y Caña de Azúcar.
- | Alta compatibilidad con 2,4-D (Weedar Full), MCPA y graminicidas.
- | Excelente control en trebol blanco, lotus sp., soja guacha y malva blanca.

Modo de Acción: Auxinas sintéticas. Acción similar al ácido indolacético (IAA). Grupo D.
Dosis Recomendada: 270 - 360 cc/ha*
Observaciones: En barbecho o sobre trigo en mezcla con WeedarFull® 0,3-0,5 lt/ha/ MCPA 1-1,5 lt/ha.
Presentación: 4 x 5 Lts.

CreditFull

- | **Herbicida a base de glifosato 70% (54% Equivalente ácido).**
- | Formulado como concentrado soluble (SL).
- | Dual Salt Technology®: único glifosato del mercado que combina dos sales de alta calidad (Monoisopropil amina + Potásica) en su formulación.
- | La mejor compatibilidad en mezclas de tanque del mercado. Especialmente con 2,4-D (Weedar Full).
- | Contiene un exclusivo surfactante que potencia su acción aún en condiciones adversas.
- | Rápida absorción y traslocación con mayor efectividad de control.

Modo de Acción: Inhibidores de la enzima 5-enolpiruvilshikimato -3-fosfato sintetasa (EPSPS). Grupo B
Dosis Recomendada: 1,5-3 lt/ha*
Observaciones: En Barbecho, posibles mezclas con WeedarFull® 0,5-0,8 lt/ha / Toram® 100 cc/ha / KambaFull® 100 cc/ha
Presentación: 20 Lts.

CreditP

- | **Herbicida a base de sal potásica de glifosato 66,2% (54% Equivalente ácido).**
- | Formulado como Concentrado Soluble (SL).

Modo de Acción: Inhibidores de la enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintetasa (EPSPS). Grupo B.
Dosis Recomendada: 1,5-3 lt/ha*
Observaciones: En Barbecho, posibles mezclas con WeedarFull® 0,5-0,8 lt/ha / Toram® 100 cc/ha / KambaFull® 100 cc/ha
Presentación: 20 Lts.

EmblemMaxx

- | **Herbicida a base de haloxyfop-p-metil 54% (52% Equivalente ácido).**
- | Formulado como concentrado emulsionable (EC).
- | Detiene el crecimiento de gramíneas anuales y perennes a los pocos días de su aplicación, produciendo posteriormente el control de las mismas.
- | Se recomienda su aplicación con aceites (mineral o vegetal metilado) para mejorar la efectividad.

Modo de Acción: Inhibidores de la acetil coenzima-A carboxilasa (ACCasa). Grupo A.
Dosis Recomendada: 120-150 cc/ha*
Presentación: 20 Lts.

Gizmo

- | **Graminicida a base de clodinafop-propargyl 24% + cloquintocet-mexyl 6%.**
- | Formulado como concentrado emulsionable (EC).
- | Postemergente, sistémico y selectivo para el cultivo de Trigo.
- | Especialmente recomendado para el control de Avena fatua y Lolium sp.
- | Se recomienda su aplicación con aceite metilado de soja para mejorar la efectividad

Modo de Acción: Inhibidores de la acetil coenzima-A carboxilasa (ACCasa). Grupo A.
Dosis Recomendada: 250 cc/ha*
Observaciones: La maleza debe estar entre 2-4 hojas, inicio de macollaje. Aplicar con aceite metilado de soja 1%/v
Presentación: 4 x 5 Lts.

Havoc

- | **Herbicida a base de cletodim 24%.**
- | Formulado como concentrado emulsionable (EC).
- | Graminicida selectivo y de acción sistémica.
- | Rápida absorción, detiene el crecimiento de las malezas a las 24 hs. de su aplicación.
- | Se recomienda su aplicación con aceites (mineral o vegetal metilado) para mejorar la efectividad.

Modo de Acción: Inhibidores de la acetil coenzima-A carboxilasa (ACCasa). Grupo A.
Dosis Recomendada: 600-800 cc/ha*
Presentación: 20 Lts.

HavocMaxx

- | **Herbicida a base de cletodim 36%.**
- | Formulado como concentrado emulsionable (EC).
- | Graminicida selectivo y de acción sistémica.
- | Rápida absorción, detiene el crecimiento de las malezas a las 24 hs. de su aplicación.
- | Se recomienda su aplicación con aceites (mineral o vegetal metilado) para mejorar la efectividad.

Modo de Acción: Inhibidores de la acetil coenzima-A carboxilasa (ACCasa). Grupo A.
Dosis Recomendada: 400-550 cc/ha*
Presentación: 20 Lts.

Kamba

- | **Herbicida hormonal a base de dicamba 57,1% (48% Equivalente ácido).**
- | Formulado como concentrado soluble (SL).
- | Acción sistémica y postemergente para el control de malezas latifoliadas.
- | Alta compatibilidad en mezclas con 2,4-D (Weedar Full), fluroxypir (Azbany y Azbany Maxx) y picloram (Toram).
- | Banda verde, clase toxicológica IV.

Modo de Acción: Auxinas sintéticas. Acción similar al ácido indolacético (IAA). Grupo D.
Dosis Recomendada: 150 cc/ha*
Presentación: 4 x 5 Lts.

KambaFull

- | **Herbicida hormonal a base de dicamba 88,8% (75% Equivalente ácido).**
- | Formulado como concentrado soluble (SL) con la mayor concentración del mercado.
- | Dual Salt Technology®: único dicamba del mercado que combina dos sales de alta calidad (Monometilamina + Dimetilamina) en su formulación.
- | Por su tecnología de formulación es menos volátil que otros productos.
- | Acción sistémica y postemergente para el control de malezas latifoliadas.
- | Alta compatibilidad en mezclas con 2,4-D (Weedar Full), fluroxypir (Azbany y Azbany Maxx) y picloram (Toram).

Modo de Acción: Auxinas sintéticas. Acción similar al ácido indolacético (IAA). Grupo D.
Dosis Recomendada: 100 cc/ha*
Presentación: 4 x 5 Lts.

MCPA 28

- | **Herbicida hormonal a base de MCPA 28% (25,2% Equivalente ácido).**
- | Formulado como concentrado soluble (SL).
- | Acción postemergente y sistémica para el control de malezas latifoliadas.
- | Excelente control de malezas crucíferas.
- | Alto sinergismo en mezcla con otros hormonales: picloram (Toram), dicamba (Kamba / Kamba Full), fluroxypir (Azbany / Azbany Maxx) y 2,4-D (Weedar Full).

Modo de Acción: Auxinas sintéticas. Acción similar al ácido indolacético (IAA). Grupo D.
Dosis Recomendada: 1,5-2,5 lt/ha
Observaciones: Excelente alternativa para control de crucíferas. Mezcla con Mextrol 0,75 lt/ha.
Presentación: 20 Lts.

Mextrol

- | **Herbicida hormonal a base de bromoxynil 34,2%.**
- | Formulado como concentrado emulsionable (EC).
- | Ideal para el control de malezas de hoja ancha.
- | Posee acción de contacto, inhibiendo la fotosíntesis.

Modo de Acción: Inhibidor de la fotosíntesis en el Fotosistema II. Grupo C3.
Dosis Recomendada: 0,75 lt/ha*
Observaciones: Puede mezclarse con MCPA 1,5 -2 lt/ha para control de crucíferas.
Presentación: 4 x 5 Lts.

Paraquat 27,6

- | **Herbicida desecante y defoliante a base de paraquat dicloruro 27,6% (20% Equivalente ácido).**
- | Formulado como concentrado soluble (SL).
- | Compatible con herbicidas residuales y hormonales.

Modo de Acción: Inhibidores del fotosistema I. Grupo D.
Dosis Recomendada: 2 lt/ha*
Observaciones: Como desecante en presiembra. Puede ir acompañado de Sumyzin 115 cc/ha u otros herbicidas hormonales
Presentación: 20 Lts.

Sumyzin

- | **Herbicida a base de flumioxazin 50%.**
- | Formulado como suspensión concentrada (SC).
- | Mayor espectro de control de latifoliadas con acción de quemado.
- | Compatibilidad en mezclas con Weedar Full y Credit Full.
- | Control residual de Conyza, Rye grass, Brassica.

Modo de Acción: Inhibidor de la enzima protoporfirinógeno oxidasa (PPD). Grupo E.
Dosis Recomendada: 115 cc/ha*
Observaciones: Aplicar en pre-emergencia de las malezas, 15 días antes de la siembra del cultivo de trigo.
Presentación: 4 x 5 Lts.

Toram

- | **Herbicida hormonal a base de picloram 28,7% (24,8% Equivalente ácido).**
- | Formulado como concentrado soluble (SL).
- | Acción postemergente y sistémica para el control de malezas de hoja ancha anuales y perennes, en cereales, caña de azúcar, lino y praderas de gramíneas.
- | Alto sinergismo en mezclas con 2,4-D (Weedar Full), MCPA y dicamba (Kamba / Kamba Full)

Modo de Acción: Auxinas sintéticas*. Acción similar al ácido indolacético (IAA). Grupo D.
Dosis Recomendada: 80-120 cc/ha*
Presentación: 4 x 5 Lts.

WeedarFull

- | **Herbicida hormonal a base de 2,4D 83,5% (70% Equivalente ácido).**
- | Formulado como concentrado soluble (SL).
- | Dual Salt Technology®: único 2,4-D del mercado que combina dos sales de alta calidad (Monometil amina + Dimetil amina) en su formulación.
- | Mayor concentración y mejor combinación de sales.
- | Rapidez de acción por mayor velocidad de absorción y traslocación dentro de la planta.
- | Mejor control de malezas en condiciones ambientales difíciles o de aguas duras.
- | Compatible con Credit Full, a baja carga de tanque.
- | Por ser una sal amina, es prácticamente no volátil y no presenta restricciones de uso.

Modo de Acción: Auxinas sintéticas. Acción similar al ácido indolacético (IAA). Grupo D.
Dosis Recomendada: 500-700 cc/ha*
Observaciones: En postemergencia del trigo, durante macollaje.
Presentación: 20 Lts.

Las dosis son orientativas. Para más información ver marbete del producto o consulte con un Ingeniero Agrónomo.

CURASEMILLAS

FUNGICIDAS

INSECTICIDAS

Matrero® 60 FS

- Curasemilla insecticida a base de imidacloprid 60%.
- Formulado como suspensión concentrada para tratamiento de semillas (FS).
- Excelente control de gusanos del suelo.
- Gran sistema que permite controlar insectos durante el estado de plántula.
- Permite el establecimiento de un cultivo sano desde su siembra.
- Genera un efecto de potenciación en el crecimiento vegetal.
- Formulado con componentes que permiten lograr el mayor poder germinativo.

Modo de Acción: Moduladores competitivos del receptor nicotínico de la acetilcolina (nAChR). Grupo 4A.

Dosis Recomendada: 60-100 cc / 100 kg de semilla*

Presentación: 1 Lt.

Nutar® 35 FS

- Curasemilla insecticida a base de tiametoxam 35%.
- Formulado como suspensión concentrada para tratamiento de semillas (FS).
- Especialmente recomendado para el control de insectos de suelo e insectos que se alimentan o succionan los tejidos vegetales.
- No produce retraso en la emergencia de las plántulas de semillas tratadas, permitiendo su normal desarrollo.

Modo de Acción: Moduladores competitivos del receptor nicotínico de la acetilcolina (nAChR). Grupo 4A.

Dosis Recomendada: 100 cc / 100 kg de semilla*

Observaciones: Preparar un slurry total de 1000 cc con agua limpia.

Presentación: 4 x 5 Lts.

EXCALIA MAX*

- Fungicida foliar con nueva carboxamida Indiflín
- Composición a base de Inpyrfluxam 6% + Tebuconazole 20%.
- Excelente eficacia contra royas en trigo: amarilla, anaranjada y del tallo
- Excelente acción sistémica y sin riesgo de fitotoxicidad.
- Aplicable en forma foliar, sin riesgo de lavado y buena fotoestabilidad.
- Formulado como suspensión concentrada (SC).

Modo de Acción: Inhibición de la respiración celular. Grupo 7 + Inhibidores de la biosíntesis de esteroides. Grupo 3.

Dosis Recomendada: 500-700 cc/ha*

Observaciones: Producto en proceso de registro.

Presentación: 4 x 5 Lts.

Mancozeb 75 WG

- Fungicida multisitio a base de mancozeb 75%.
- Formulado como gránulos dispersables (WG).
- Simplicidad y practicidad de manejo por su formulación.
- Es preventivo y actúa por contacto.
- Ideal para el manejo antibioresistencia de enfermedades fúngicas.

Modo de Acción: Inhibidores multisitio. Grupo M3.

Dosis Recomendada: 2.5 kg/ha*

Presentación: 25 Kgs.

TazerXpert

- Fungicida coformulado compuesto por azoxistrobina 25% + epoxiconazole 12,5%.
- Formulado como solución concentrada (SC).
- La mayor concentración de Azoxistrobina del mercado, lo que permite reducir la dosis de uso.
- Con acción de contacto y sistémica.
- Efecto preventivo, curativo y erradicante.
- Especialmente recomendado para el control de manchas y royas en trigo.

Modo de Acción: Inhibidores del complejo III de la respiración. Grupo 11. + Inhibidores de la biosíntesis de esteroides. Grupo 3.

Dosis Recomendada: 300-400 cc/ha*

Observaciones: Aplicar con aceite mehlado de soja 1 %v/v

Presentación: 4 x 5 Lts.

Tebuconazole 43

- Fungicida a base de tebuconazole 43%.
- Formulado como suspensión concentrada (SC).
- Inhibe la síntesis de Ergosterol de los hongos limitando su crecimiento y esporulación.
- Acción sistémica con efecto curativo y antibiosporulante.
- Presenta muy rápida absorción.
- Amplio espectro en el control de enfermedades.

Modo de Acción: Inhibidores de la biosíntesis de esteroides. Grupo 3.

Dosis Recomendada: 350-450 cc/ha*

Observaciones: Aplicar al observar las primeras pustulas o manchas.

Presentación: 4 x 5 Lts

Klorpan

- Insecticida a base de clorpirifos 48%.
- Formulado como concentrado emulsionable (EC).
- Acción de contacto, ingestión e inhalación con un amplio espectro de control.
- Rápido poder de volteo.

Modo de Acción: Inhibidores de la acetilcolinesterasa (AChE). Grupo 1B.

Dosis Recomendada: 300-400 cc/ha*

Observaciones: Para pulgones, en cuanto se observan los primeros focos.

Presentación: 20 Lts.

Las dosis son orientativas. Para más información ver marbete del producto o consulte con un Ingeniero Agrónomo.

agro.ar.sumitomochemical.com


SUMITOMO CHEMICAL

 @sumitomochemicalargentina
  @sumitomochem_ar
  @sumitomochemicalargentina
  Sumitomo Chemical Argentina

Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.