

Eliminá las enfermedades de tu trigo y cebada con la mayor tecnología.



Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.


SUMITOMO CHEMICAL


TazerXpert

PRINCIPIO ACTIVO



Azoxistrobina



Epoconazole

COMPOSICIÓN

25% + 12,5 % SC

Tazer® Xpert combina 2 modos de acción potenciando el efecto de Azoxistrobina con Epoconazole, el triazol de mayor performance del mercado. Esta combinación brinda el **mejor efecto preventivo, curativo y erradicante** contra royas y manchas en trigo.

AZOXISTROBINA

- Acción sistémica con rápida acción.
- Actúa sobre el proceso respiratorio del patógeno.
- Inhibe la germinación de esporas.
- Detiene el desarrollo inicial del hongo.
- Actividad translaminar y alta persistencia.

EPOXICONAZOLE

- Acción sistémica con alta persistencia.
- Traslocación acrópeta (desde la base al ápice).
- Detiene el crecimiento del micelio y evita la esporulación.

Control de enfermedades con TazerXpert

PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE CONTROLA Roya anaranjada (*Puccinia triticina*),
Roya amarilla o lineal del trigo (*Puccinia striiformis*),
Roya negra (*Puccinia graminis*), Mancha amarilla (*Drechslera tritici repentis*), Septorios (*Septoria tritici*).

Recomendaciones de uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (CM ³ /HA)	MOMENTO DE APLICACIÓN
Trigo	Roya anaranjada (<i>Puccinia recondita</i>) Roya amarilla o lineal del trigo (<i>Puccinia striiformis</i>) Roya negra (<i>Puccinia graminis</i>) Mancha amarilla (<i>Drechslera tritici repentis</i>) Septorios (<i>Septoria tritici</i>)	300 - 400 +1 % v/v aceite metilado de soja	Aplicar en hoja bandera (Zadoks 3.9), al aparecer los primeros síntomas
Cebada	Mancha en red (<i>Pyrenophora teres</i> / <i>Drechslera teres</i>) Roya de la cebada (<i>Puccinia hordei</i>) Mancha borrosa de la cebada (<i>Bipolaris sorokiniana</i>)	300 - 400 +1 % v/v aceite metilado de soja	Realizar las aplicaciones a partir de encañazón, con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. En años con alta presión de la enfermedad y condiciones favorables para su desarrollo, realizar aplicaciones cada 3 – 4 semanas.

Momentos de la aplicación:

TRIGO

Barbecho Químico

Pre Siembra

Z0 Germinación

Z1-Z2 Establecimiento Macollaje

Z3 Encañazón

Z4-Z8 Floración Llenado de granos

Z9 Madurez

Fungicidas



TazerXpert

Características técnicas y principales beneficios:



CONCENTRACIÓN

Azoxistrobina 25% + Epoconazole 12,5%



FORMULACIÓN

Suspensión concentrada (SC)



USO

Fungicida sistémico de aplicación foliar



TARGET

Manchas y royas



MODO DE ACCIÓN

Inhibición del complejo III de la respiración (Grupo 11) e inhibición de biosíntesis del ergosterol (Grupo 3)



CULTIVOS

Soja, Trigo, Maíz, Cebada, Maní



DOSIS RECOMENDADA

Ver etiqueta



PRESENTACIÓN

4x5 Lts.



BANDA TOXICOLÓGICA

Azul (Categoría III)



BENEFICIOS:

El triazol con mayor eficacia del mercado. Alta concentración de Azoxistrobina. Acción preventiva, curativa y antiesporulante. Combina dos modos de acción retrasando la aparición de resistencia. Amplio espectro de control.